

	M±m	Cv,%	M±m	Cv,%	M±m	Cv,%
Яғрин баландлиги	94Д±070	2,50	93Д±0,52	1,72	92,0± ^{o+86}	3,41
Кўкрак чуқурлиги	35,8± ^{^42}	3,45	34Д±0.41	3,45	32,3± ⁺⁺³⁹	3,82
Кўкракэни	25,6± ⁰⁺²⁴	3,08	24,0± ^{o+45}	7,14	22,1± 0,32	5,59
Тананинг қия узунлиги	97,6± ^{^93}	3,12	96,3±0.43	3,10	94,6± ^{C<80}	3,1
Кукрак айланаси	101,7±0,88	2,79	100,3± ^{o+70}	0,19	90,0±1,05	3,44
Орка дўнгсуякэни	25,8± ^{£-31}	3,51	24,3± ^{o-33}	3,39	22,7± 0,31	3,84
Пойча айланаси	13,1±0*25	4,47	12,6±a29	5,90	11,9+0.19	3,79
Тирик вазни	116,4±2.07	6,36	110,4±2Д3	6,33	106,8±2 ^{o3}	6,35

Жадвал маълумотларидан кўринишича, II-тажриба гуруҳидаги бузоқларнинг 3-ойликдаги яғрин баландлиги 93,3 см., кўкрак эни 24,0 см., танасининг қия узунлиги 96,3 см., орка дўнг суяк эни 24,3 см., кўкрак чуқурлиги 34,1 см., кукрак айланаси 100,3 см., пойча айланаси 12,6 см- ни ташкил этиб, назорат гуруҳидаги тенгдошлариникидан тегишли равишда 1,3 см., 1,9 см., 1,7 см., 1,6 см., 1,8 см., 1,3 см. ва 0,7 см.га юқори кўрсаткичларга эга бўлди.

Озиклантириш схемалари ва рационлари хўжаликда мавжуд озуқаларга асосан тузилиб улар бузоқларнинг нормал ўсиши ва ривожланишини таъминлаши зарур. Ёз даврида сутдан чиққан бузоқлар учун беда, маккажўхори, жавдар ва бошқа озуқабоп экинлар кук массаси ҳамда концентратлар, киш даврида эса маккажўхори силоси, озуқа лавлагиси, беда пичани, ўт уни ҳамда концентратлар асосий озуқалар ҳисобланади. Минерал моддалар манбаи сифатида бузоқларга комбикорма, ош тузи, мел, ва бошқа макро қушилмалар берилди. Ўсиб бораётган бузоқларнинг микроэлиментларга булган талабини кондиритиш учун рационга микроэлиментлар туз ҳолида, мавжуд нормаларга асосан берилди.

Бузоқлар 3 маҳал озиклантирилади. Озиклантириш яйратиш майдончаларида озуқа тар-қатгичлар ёрдамида берилди. Дағал ва ширали озуқалар(силос, пичан, лавлаг, сомон) аралаш озуқа ҳолида бериш мумкин. Бузоқларни озиклантириш ўсиш режасига асосан олиб борилади. Бу эса, наслдор ва маҳсулдор қорамоллар подасини шакллантиришда муҳим омил ҳисобланади.

Резюме:

В статье приведены результаты опытов по получению максимального роста и развития телят раннего возраста. Определены состав и количество кормов для телят, а также время дачи концентратов, витаминов и минеральных подкормок. Annotatsiya

Maqolada maksimal o'sish va yosh bicoqlaming rivojlantirish olish tajribalar natijalari. Tarkibi va oanaq miqdori bicoqlaming uchun, shuningdek, vaqtdachalar, vitaminlar va mineral qo'shimchalar kontsentratlar.

Summary:

The results of the experiments on obtaining maximum growth and development of young calves. The composition and quantity of feed for calves, as well as the time concentrates cottages, vitamins and mineral supplements.

УДК :619.618.19.

МАСТИТ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШДА ПРЕПАРАТЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ

**Болиев ПЛ., Қўлдошев О. У., Мавланов СИ.,
Қурбонов Ф., Қувватов Х.,**

Ветеринария илмий-тадқиқот институт, Ўзбекистон.

Чорвачиликнинг етакчи тармоқларидан бири, мамлакат аҳолисини сифатли ва қимматбаҳо чорва маҳсулоти бўлмиш сут билан таъминлашда суг ишлаб чиқаришга икгисослашган қорамолчилик фермалари ҳисобланади. Сут ишлаб чиқаришни кўпайтиришга асосий омилларидан бири - соғим сигирлар бош сонини ва улардан соғиб олинган сут маҳсулотини кўпайтиришдан иборатдир. Бироқ мол бош сонини кўпайтириш, улардан олинган маҳсулотларни кўпайтиришда тўсиқ бўлаётган муоммолардан бири ҳайвонларни турли хил касалликлари бўлиб, бу касалликлар ичида кенг тарқалган елин касалликлари(маститлар) ҳисобланади. Мастит касаллиги барча қишлоқ хўжалик ҳайвонларида, йил давомида учрайди. Сигирлар асосан касаллик билан туққандан кейин 10-15 кунлари ва соғим юқори бўлган пайтларда касалланади.

Хўжаликларда мавжуд соғим сигирларнинг 15-20 % яширин маститлар билан, 16-25 % клиник

маститлар билан касалланганлиги тажрибаларда аниқланди. Маститлар суг безларининг симптомсиз(субклиник) ҳолатда кечадиган ёки сероз, катарал, фибриноз, йирингли, геморагик яллигланишлар билан бирга кечадиган касаллик бўлиб, улар махалл и й тарзда кечади ёки ҳайвон ҳаёти учун хавфли бўлган септик процессга айланиб кетадиган касаллик ҳисобланади.

Кўпгина чет эллик ва ўзимизнинг олимларимизнинг таъкидлашича суг етиштирадиган чорвачилик фермер хўжаликларида йил давомида мавжуд сигирларнинг 20-30 % мастит касаллиги билан касалланиши кузатишган. Мастит касаллиги хўжаликка қапа иқтисодий зарар келтириш билан биргаликда инсонлар соғлиғи учун ҳам хавфли ҳисобланади.

Фермадаги мавжуд соғин сигирларнинг елин(мастит) касаллигига диагностик текширганимизда 31 бошида един мастит касаллиги аниқланди. 31 бош мастит билан касалланган сигирлар 3 гуруҳга бўлиниб, даволаш ишлари олиб борилди. Сигирларда учрайдиган елин(мастит) касалликларини даволашда ишлаб чиқарилган мултимаст ва мастилекс препаратлари қўлланилди. Тажрибадаги биринчи гуруҳ сигирларга “Мултимаст” ва иккинчи гуруҳ сигирларга “Мастилекс” препаратларидан фойдаланиб уни елин сўргичлари орқали юбордик организмда моддалар алмашинувини яхшилаш мақсадида мускул орасига “Мултивит минерал” препаратини қўлладик. Учунчи гуруҳ сигирлар назорат бўлиб улар умумий қабул қилинган усулларда даволанди. Пенициллин ва стрептомицин дистилланган сувда, физиологик эритмада ёки физиологик эритмада тайёрланган 0,25-0,5 %ли новокаин эритмасида эригилиб юборилди. Пенициллин билан стрептомициннинг юбориш миқдорлари 150-200-300 минг ТБ дан ҳисобида эритилади. Бу антибиотикларни юбориш учун ишлатиладиган эритувчи эритмаларни миқдори 15-20-30 млдан иборат бўлади. Пенициллин ёки стрептомицин 0,25 % ли новокаин эритмасида юборилиб



Мастилекс препаратини кўриниш.

даволанди. Антибиотикларни новакаинда эритишни сабаби суг цистернаси ва елин сўргичлари канали шиллик пардаларининг вақтинча оғриқсизлантириш учун ишлатилди. Натижалар жадвалда келтирилган. Қўлланилган дорилар ўзининг ижобий самарасини берди.

Ўтказилган тажрибаларда аниқландиким сигирларнинг елин мастит касаллигида “Мултимаст” ва “Мастилекс” препаратлари юқори самара бериши тажрибаларда аниқланди. Ҳозирги вақтда елин маститини даволашда янги “Мастилекс” препарата мавжуд бўлиб, таркибида цефалексин, гентамицин сақдайди. Стафилакокк, стрептококк, эшерихи, колибактерий. кўзгатувчиларига таъсир этади. Бу препарат организмга ижобий таъсир этиши тажрибаларда кузатилди.

Касалликни даволашдан кўра унинг олдини олиш муҳимдир ,шунинг учун маститларнинг келтириб чиқарувчи сабаблари жуда кўп бўлганлиги уларни олдини олиш чоралари ҳам ҳар томонлама бўлиши керак. Маститларнинг олдини олиш борасида қўриладиган асосий чора-тадбирлар қуйидагилардир;

Мастит касаллигини даволашда препаратлар самараси.

1-жадвал.

№	Мастит билан касал сигирлар бош сони	Даволашда ишлатилган дорилар номи, юбориш миқдори	Натижалар
1	13 бош сигир	Мултимаст препарати елин сўргичлари орқали юборилиб 3 кун давомида ҳар 12 соатда даволанди.	90 % 2 бош сигир иккинчи марта даволанди.
2	13 бош сигир	Мастилекс(таркиби цефалексин, гентамицин) 10 мл. сургичлари орқали юборилиб 3 кун давомида ҳар 12 соатда даволанди.	100%
3	5 бош сигир	Пенцилин стрептомицин 0,25-0,5 % ли новокаинда эригилиб 10 мл. сўргичларга юборилиб даволанди.	70% 2 бош сигир елини яроқсиз бўлиб қолди



Касалликни даволашдан кўра унинг олдини олиш муҳимдир, шунинг учун маститларнинг келтириб чиқарувчи сабаблари жуда кўп бўлганлиги уларни олдини олиш чоралари ҳам ҳар томонлама бўлиши керак. Маститларнинг олдини олиш борасида қурил адиган асосий чора-тадбирлар қуйидагилардир;

- ҳайвонлар тўла қийматли ва сифатли озукалар билан тўғри боқиб, ошқозон-ичаклар касалликлари пайдо бўлишига, озукадан захарланишига ва моддалар алмашинувининг бузил ишига йўл қўймаслик керак.

- ҳайвонларни ветеринария-санитария ва зоогигиеник

Мастит билан касалланган сизир елини талабларга жавоб берадиган шароитларда асраб, умуман бутун организмнинг, хусусан, елининг касал бўлиши ва шикастланишларига йўл қўймаслик керак;


- сут соғувчилар сизирларнинг елинига қараб юриши, соғиш ва шахсий гигиена қоидаларига қатъий амал

қилиши лозим;

Касалланган елин сўргичидан соғиб олинган сут(серроз маститда);

- молхонада ишлатиладиган буюмлар, сут соғиш аппаратлари, соғимга керакли асбоб - ускуналар тоза

ва озода, соз ҳолатда сакданиши керак;



- сизирларни туғуруққа тўғри тайёрлаб бориш, туғуруқ хоналарни ташкил этиш, туғуруқ вақтида кечикмасдан ва малакали ёрдам бериш керак;

- туғуруқдан кейинги даврнинг тўғри ўтишини ва туғуруқдан кейин пайдо бўладиган касалликларнинг олдини олишни таъминлаш лозим;

- соғимдан сўнг елин сўргичларини махсус дезинфекторлар солинган стаканлар ёрдамида дезинфекция қилиб бориш;

- сизирлар сутдан чиқарилгандан сўнг сўргич каналлари орқали елига маститларни олдини олиш учун антибиотиклар юбориш керак.

Хулоса қилиб айтганда, мастит касаллигининг олдини олишда юқорида келтирилган чора-тадбирларга амал қилган фермаларда йил давомида касаллик учрамайди. Мастит билан касалланган сизирларни даволашда ишлатилган

мултимаст ва мастилекс препаратлари самарадорлиги

тажрибаларда юқорилиги исботланди. Уларни янада кенг миқёсда ўрганиб, мастит касаллиги таркалган чово фермер хўжаликларида жорий этиш тавсия этамиз.

Резюме:

В этом стати приведена эффективность препарата Мастилекс и Мултимаста при лечение дойных коров мастита.

Summary:

In this article is decried the results of study Mastileks is Myltimasta preparation for effectiveness to treat udder diseases(mastitis) of dairy cows.

Калит сўзлар; мастит, елин, симптомсиз, субклиник, яширин, клиник, мастилекс, маститсан, мултимаст, мултивит минерал, сўргич, соғим сизирлар, пенициллин, стрептомицин, серроз, катарал, фибриноз, йирингли, геморагик.

Фовдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Акатов. В.А. Кононов. Г.А. Поселов А.И. Смирнов И.В. Ветеринарной акушерства и гинекология. Л. «Колос», 1977 г.
2. Акатов В.А. и др. Практикум по акушерству гинекологии и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Издательство. «Колос» Москва-1968 г.
3. Акмалхонов Ш. ва бош. Пневмомассаж-сизирлар сут махсуддорлигини оширишнинг муҳим омиллари 28- бет.Ж.Зооветеринария №10.2015 йил.
4. Аширов Б. М. и др. - Зависимость молочной продуктивности коров генотипа от продолжительности сухостойного периода. № 1 I.Ст.30. Ж. Зооветеринария. 2015 год
5. Белозерцева Н.С.и др. - Молочная продуктивность и качественный состав молока черно- пестрых коров различного типа телосложения, Ст.28.Ж.Зооветеринария. №12.2015 й.
6. Букаров Н. и др. - Оценка состояния обмена веществ дойных коров составу молока.31. № 9Ж.Зооветеринария. 2015 год