

БОЛАЛАРДА ДОРИ АЛЛЕРГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

**Урозалиев С., Нормурадов М., Абдурахманова Л., Урозалиев Ф., - 2 курс
клиник ординатура резидентлари**

**Темиров М. Т. 620 гуруҳ 1 Педиатрия ва халқ таъбири факультети Илмий
рахбар: доцент Тухтаева О.Т.**

**ТошПМИ, Аллергология, клиник иммунология, микробиология
кафедраси**

Долзабрилиги. Кейинги йилларда полипрагмазия, шифокор кўригидан ўтмасдан дори моддаларини ўзбошимчалик билан, ноўрин қўллаш ва дори моддаларини қўп тартибсиз қабул қилиш оқибатида болаларда турли хил аллергия реакциялар кузатилмоқда. Болаларда аллергия касалликларнинг клиникасида ва этиология тузилишида медикаментоз аллергия муҳим ўрин эгаллайди. Болаларда дори моддаларига аллергия реакциялар ва аллергия касалликларнинг тартиб бориши замонвий тиббиёт муаммолари орасида олдинги ўринлардан бирини эгаллаши, ушбу патологияларни чуқур ўрганишни тақоза этади.

Ишнинг мақсади. Болаларда дори аллергиясининг клиник кечишини ўрганиш.

Материал ва усуллар. Тошкент шаҳридаги 1 Шаҳар клиник болалар шифохонасида 4-18 ёшгача бўлган 11 та дори аллергияси ташхиси билан даволанган болаларнинг касаллик тарихлари таҳлил қилиб чиқилди ва 6 та турли даражадаги дори аллергияси билан даволанаётган болаларда касалликнинг клиник кечиши ўрганиб чиқилди.

Текширув натижаларига кўра дори аллергиясининг 45,8% (асосий) қисми асосан ўткир респиратор касалликларда антибиотиклар қўлланиши натижасида, 15,2 % ўткир респиратор вирусли касалликларда, 15,4 % сурункали ошозон ичак касалликларида, 15,3% зотилжамларда, 8,3% бошқа ҳолатларда намоён бўлган.

Кузатувимизда бўлган болаларнинг умумий аҳоли оғир ёки ўртача оғирлик даражада намоён бўлди. Дори аллергиясининг клиник кечиши ҳар бир болада узиға ҳос турлича кузатилди. турли даражадаги респиратор симптомлар; бурун битиши, ринит белгилари, йўтал (қуруқ, нам), нафас етишмовчилигининг турли даражалари, хансираш (экспиратор) билан бирға, турғун эритема, қаварчиқлар, Квинке шиши, анафилактик шок, атопик дерматит қўзғалишининг турлича кўринишлари қайд этилди. Дори аллергиясининг клиникаси асосан пенициллин ва цефалоспорин гуруҳидаги антибиотиклар қабулидан сўнг ва иситма туширувчи дори моддалардан асосан Ибуфенни тартибсиз, шифокорлар тавсиясиз, ўзбошимчалик билан нотўғри қўллаш натижасида келиб чиққанлиги аниқланди.

Хулоса. Болаларда дори аллергиясининг клиникаси асосан; турғун эритема, қаварчиқлар, Квинке шиши, анафилактик шок, атопик дерматитнинг қўзғалиши, ва асосий касаллик симптомларининг оғир кечиши билан кузатилди.

Дори моддаларға аллергия реакцияларнинг патогенетик асосини иммун жараёнлар ташкил қилади. Дори аллергиясида клиник симптомлар турғунлиги ҳар бир бемор болада индивидуал бўлиб болалардаги йулдош касалликлар ҳисобига турлича намоён бўлди.

Дори аллергиясини ривожланиш асосан пенициллин ва цефалоспорин гуруҳидаги антибиотиклар қабулидан сўнг ва иситма туширувчи дори моддаларни тартибсиз, шифокорлар тавсиясиз, ўзбошимчалик билан нотўғри фойдаланиш натижасида ривожланганлиги аниқланди.

Дори аллергияси содир бўлмаслигининг олдини олиш учун дориларни фақат шифокорлар тавсиясига асосан қабул қилиш лозимлиги тўғрисида ахоли ўртасида профилактик тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Деворова, М. Б., and М. И. Шайхова. "Влияние реактивности организма на клинические формы респираторной аллергии у детей." Врач-аспирант 62.1.2 (2014): 255-259.
2. Devorova, M. B., and E. A. Shamansurova. "ALLERGIC DISEASES IN CHILDREN FROM MOTHERS WITH AN ALLERGIC HISTORY AND ASPECTS FORMATION OF FOOD INTEGRABILITY." Colloquium-journal. No. 11-3. Голопристанський міськрайонний центр зайнятості= Голопристанский районный центр занятости, 2020.