

ИЗУЧЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ПРИ РАКЕ ПОЛОСТИ РТА

Холмухамедов Д.А.

Ташкентский государственный стоматологический институт

E-mail: dil~wodb3k@gmail.com

Актуальность. Ежегодно в мире заболевает плоскоклеточным раком органов полости рта и глотки более 11000 человек. Одногодичная летальность по статистике последнее десятилетие остается неизменной и составляет более 40%. Несмотря на доступность клиническому осмотру полости рта, выявление заболевания на ранних стадиях (cT1-2N0M0) составляет чуть более 30%. Для рака органов полости рта и глотки характерен быстрый инфильтративный рост, приводящий к раннему вовлечению в опухолевый процесс соседних анатомических структур. Характерным свойством рака слизистой органов полости рта и глотки является частое развитие регионарных метастазов, достигающее по данным различных авторов 40-70%. Злокачественные новообразования полости рта и глотки занимают второе место среди причин смертности населения и в связи с ее неуклонным ростом являются одним из негативных показателей в динамике состояния здоровья населения Узбекистана.

Целью исследования является изучение заболеваемости и смертности при раке полости рта в Республике Узбекистан.

Методы исследования: для изучения показателей состояния онкологической службы использованы данные Государственной статистической отчетности «Сведения о больных раком органов полости рта и глотки» по Российской Федерации и Республике Узбекистан за период 2008-2017 гг. Сбор данных осуществляли по общепринятым методикам. По Республике за 2008г., 2013г., 2015г., 2017г. показатель встречаемости рака органов полости рта губы, вновь выявленных при проведении профилактических осмотров, составил в 2008г.- 57,9%, в 2013г. - 63%, в 2015г. - 47%, в 2016г. - 41,5%. В 2017гг. отмечалось падение процента больных со злокачественными опухолями полости рта и глотки, вновь выявленных при проведении профилактических осмотров, 37,8% > 29,5%. Также, снижение показателя наблюдался в группе больных со злокачественными **опухолями** нёба, который составил в 2013г. - 37,5%, в 2015г. - 26,7%, а в 2017г.. Однако, в 2013, 2015, 2016гг. в группах больных со злокачественными опухолями. **дна** полости рта, других неуточненных отделов полости рта отмечался рост с 22,4% до 26,8%, с 21,3% до 28,2% и с 20,9% до 27,3% соответственно,

Выводы. Таким образом, совершенствование работы в перечисленных направлениях может способствовать улучшению онкологической службы страны и позволит усовершенствовать специализированную помощь населению, соответствующую современному техническому развитию медицинской науки.

Список литературы:

1. Каюмова, Н., Хасанов, Ш., Хаджиметов, А., & Жилонова, З. (2021). Оценка состояния местного иммунитета полости рта у больных острым гнойным одонтогенным оститом. *in Library*, 21(2), 22–25. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/13595>