

SUT TISHLARNI VAQTIDAN OLDIN OLINISHI SABABLI YUZAGA KELUVCHI IKKILAMCHI DEFOTMATSIIYA TURLARI.

Karimova M.A., 505a guruh "Bolalar stomatologiyasi" fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: Aripova G.E., Ortodontiya va tishlarni protezlash kafedrasida dotsenti

Rasulova Sh.R., Ortodontiya va tishlarni protezlash kafedrasida assistenti

Tashkent davlat stomatologiya instituti, O'zbekiston

Dolzarbli: Hozirgi vaqtda bolalarda karies va uning oqibatlarini, jarohat va boshqa sabablar tufayli tishlarni yo'qotilishi ko'p uchramoqda. Sut tishlarini vaqtidan oldin yo'qotilishi esa o'z navbatida bir necha xil ikkilamchi defotmatsiyalarni rivojlanishiga sabab bo'ladi. Natijada bolalarda tish qatorlari va tishlov buzilishi kuzatilmoqda.

Bunda bolalarda tishlarning retensiyasi yoki doimiy tishlarning chiqishi kechikishi kuzatiladi. Chunki, sut tishlari olingandan so'ng doimiy tish kurtaklarini rivojlanishini stimullovchi omil ham yo'qotiladi. Shuningdek, sut tishlarini erta olinishi jag' suyaklarini o'sishini sekinlasib, rivojlanishdan ortda qolishiga ham sabab bo'ladi. Sut chaynov tishlari yoki ba'zan doimiy birinchi molyarlarning erta yo'qotilishi esa tishlovning chuqurlashuvi, yuzning pastki qismi kaltalashuvi bilan namoyon bo'ladi.

Tadqiqot maqsadi: Bolalarda sut tishlarini vaqtidan oldin yo'qotilganda kelib chiquvchi ikkilamchi deformatsiya turlarini o'rganish.

Materiallar: 26 ta bemor bemorning fotosuratlarini, ortopantomogramma va yon telerentgenogrammasi, modellari.

Metodlar: 26ta bemorning fotosuratlarini, ortopantomogramma va yon telerentgenogrammasi tahlili, modellarining antropometrik tahlili.

Tadqiqot natijasi: Tadqiqotdan quyidagi natijalar olindi:

Xulosa: Sut tishlarining erta tish qatorlari va tishlovdagi ikkilamchi o'zgarishlaridan tashqari olinishi ham estetik ham nutq buzilishiga sababchi bo'ladi. Ikkilamchi deformatsiyalar har bir bemorda individual rivojlanib, boalarning qaysi yoshida olinishiga, qaysi guruh tishlarning yo'qotilganiga qarab turli ko'rinishlarda namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Глухова, Ю. М., and Н. С. Шпак. "Применение индекса ICON при оценке эффективности исправления зубочелюстных аномалий у подростков и взрослых." Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России 3 (2014): 2-2.

2. Murtazaev, Saidmurodkhon Saidaloevich, Makhmud Zakirovich Dushmanmedov, and Saidazim Saidagzamovich Murtazaev. "Ethnic aspects of orthognathic bite." European science review 7-8 (2015): 80-84.

3. Шомухамедова, Ф., Д. Сулейманова, and Г. Муротова. "ОЧИК ПРИКУСЛИ БЕМОРАНИ ТАШХИСИ ВА УЛАРИ ОРТОДОНТИК ДАВОЛАШ." Медицина и инновации 1.4 (2021): 442-446.

4. Kovalenko, L. I., et al. "DARST. UND TRENNUNG VON EXO- UND ENDO- 1, 3- DIMETHYL- BICYCLO (2, 2, 1) HEPTAN." Chemischer Informationsdienst. Organische Chemie 1.33 (1970): no-no.

5. Рузметова, И. М., Р. Нигматов, and Ф. А. Шомухамедова. "Изучение аномалии зубочелюстной системы и профилактика вторичных деформации зубной дуги у детей в период сменного прикуса." Вестник КГМА им. ИК Ахунбаева 4 (2015): 50-55.

6. Флейшер, Григорий. Пропедевтика детской ортопедической стоматологии. Руководство для врачей. Litres, 2022.

7. Расулова, Ш., et al. "Построение математической модели с учётом зависимости длины переднего отрезка зубных рядов и ширины верхних резцов (по Корхаусу)." Stomatologiya 2 (83) (2021): 44-46.